

Canevas Questions et Réponses pour L'ÉJC^{MD}

Le Bureau national d'examen dentaire du Canada

Dernière mise à jour Octobre 2024

DROITS D'AUTEUR

Tous les droits et intérêts (incluant les droits d'auteur) relatifs aux Canevas Questions et Réponses pour l'ÉJC sont la propriété du Bureau national d'examen dentaire du Canada (BNED). La reproduction des Canevas Questions et Réponses pour l'ÉJC n'est permise que selon les termes spécifiés par le BNED. Toute copie ou manipulation des Canevas Questions et Réponses pour l'ÉJC est strictement interdite. Le BNED interdit strictement l'ajout de réponses, de choix de réponses, de commentaires ou tout autre contenu additionnel à ces Canevas Questions et Réponses pour l'ÉJC. De plus, le BNED interdit strictement la vente des Canevas Questions et Réponses pour l'ÉJC et la distribution ou vente de tout matériel ayant pour but de fournir des réponses à ces Canevas Questions et Réponses pour l'ÉJC. Veuillez communiquer avec le BNED par courriel (info@ndeb-bned.ca), ou par téléphone, (613-236-5912), pour demander l'autorisation de reproduire les Canevas Questions et Réponses pour l'ÉJC.

Évaluation du Jugement Clinique^{MD}

Format des Questions

Certaines questions n'ont qu'une seule bonne réponse, tel qu'indiqué par la directive "Choisir **UNE** bonne réponse." Choisir la réponse la plus probable et la plus appropriée.

Certaines questions de l'examen auront plus qu'une seule bonne réponse. Ces questions sont identifiées par la directive "**Choisir UNE OU PLUSIEURS bonnes réponses**". Pour faciliter la lecture, le pluriel est utilisé pour toutes les questions qui peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses et qui s'accompagnent de la directive « Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonne réponses ».

Exemples de questions sur le diagnostic, le plan de traitement et la prise de décisions cliniques

Informations sur le patient:			
Pierre Untel 123 rue Main Ottawa, Ontario			
Âge:		Pression artérielle:	mmHg
Sexe:		Fréquence cardiaque:	bpm
Taille:	cm	Fréquence respiratoire:	/min
Poids:	kg	Température:	°C
Plainte principale:			
Histoire de la plainte principale:			
Histoire dentaire:			
Histoire médicale:			
Renseignements significatifs:			
Médication courante:			
Allergies:			
Histoire sociale/familiale:			
Renseignements significatifs:			
Examen clinique:			
Observations importantes:			
Extraorales:			
Intraorales:			

Question: 1 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)


Lesquels parmi les choix suivants devraient être inclus dans le plan de traitement pour la prise en charge de ce patient?

- ☐ Antibiothérapie prophylactique.
- ☐ Confirmer le taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c) du patient.
- ☐ Obtenir un INR à jour avant une intervention chirurgicale.
- ☐ Administration d'une médication anxiolytique/sédative.
- ☐ Nitroglycérine en prophylaxie.
- ☐ Éviter les AINS.
- ☐ Éviter les opioïdes.
- ☐ Éviter l'épinéphrine.
- ☐ Minimiser l'utilisation d'épinéphrine.
- ☐ Éviter les anesthésiques locaux.
- ☐ Arrêter la médication courante avant le rendez-vous.
- ☐ Retarder les traitements de routine.
- ☐ Traiter à la fin de la journée.
- ☐ Doit être traitée en milieu hospitalier.
- ☐ Aucun des choix ci-dessus.

Question: 2 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

En plus du sondage parodontal et de la palpation, lequel/lesquels parmi les tests et examens suivants est/sont indiqué(s) pour établir le diagnostic chez ce patient?


- ☐ Radiographie rétroalvéolaire.
- ☐ Radiographie rétrocoronaire.
- ☐ Radiographie panoramique.
- ☐ Percussion de la dent.
- ☐ Application de pression sur chaque cuspide.
- ☐ Évaluation de la mobilité dentaire.
- ☐ Test pulpaire électrique.
- ☐ Test thermique.
- ☐ Évaluation de l'occlusion.
- ☐ Anesthésie locale sélective.
- ☐ Test sanguin.
- ☐ Test microbiologique.
- ☐ Frottis cytologique.
- ☐ Biopsie d'incision.
- ☐ Biopsie-exérèse.



Question: 3 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité présente sur l'image?


- ☐ Linea alba.
- ☐ Granules de Fordyce.
- ☐ Leucoedème.
- ☐ Leucoplasie.
- ☐ Kératose frictionnelle/leucokératose traumatique.
- ☐ Brûlure à la muqueuse.
- ☐ Lichen plan.
- ☐ Candidose.
- ☐ Leucoplasie chevelue.
- ☐ Lupus érythémateux.
- ☐ Naevus blanc spongieux.
- ☐ Langue géographique.
- ☐ Plaques muqueuses de la syphilis secondaire.
- ☐ Langue chevelue.
- ☐ Carcinome verruqueux.



Question: 4 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité présente sur l'image?


- ☐ Ulcère aphteux.
- ☐ Herpès zoster.
- ☐ Ulcère traumatique.
- ☐ Herpès simplex récurrent.
- ☐ Gingivostomatite herpétique primaire.
- ☐ Gingivite ulcéraive nécrosante.
- ☐ Langue géographique.
- ☐ Herpangine.
- ☐ Tatouage d'amalgame.
- ☐ Érythroplasie.
- ☐ Carcinome spinocellulaire.
- ☐ Pemphigoïde des membranes muqueuses.
- ☐ Pemphigus vulgaire.
- ☐ Érythème polymorphe.
- ☐ Mélanose du fumeur.



Question: 5 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité présente sur l'image?

- ☐ Torus.
- ☐ Granulome pyogène.
- ☐ Mucocèle.
- ☐ Hémangiome.
- ☐ Polype fibroépithélial/fibrome d'origine traumatique.
- ☐ Neurome traumatique.
- ☐ Papillome/verruca vulgaris.
- ☐ Adénome salivaire.
- ☐ Tumeur à cellules granuleuses.
- ☐ Kyste gingival.
- ☐ Abscès.
- ☐ Stomatite prothétique.
- ☐ Epulis fissuratum/hyperplasie d'irritation prothétique.
- ☐ Carcinome spinocellulaire.



Question: 6 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels des choix suivants sont indiqués pour la prise en charge de l'entité présente sur l'image?

- ☐ Pas de traitement.
- ☐ Antimicrobien topique.
- ☐ Antimicrobien systémique.
- ☐ Corticostéroïde topique.
- ☐ Corticostéroïde systémique.
- ☐ Anesthésique topique.
- ☐ Analgésique systémique.
- ☐ Pansement protecteur.
- ☐ Éliminer le facteur étiologique.
- ☐ Débridement.
- ☐ Biopsie d'incision.
- ☐ Biopsie-exérèse.
- ☐ Évaluation médicale.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Buccal															
Dent															
Profondeur au sondage										-	-	-			
Récession										-	-	-			
Saignement au sondage										-	-	-			

Lingual															
Dent															
Profondeur au sondage										-	-	-			
Récession										-	-	-			
Saignement au sondage										-	-	-			

Mobilité											-				
Furcation											-				

Question: 7 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Quels sont les diagnostics pour ce patient?

- ☐ Santé gingivale clinique.
- ☐ Parodonte intact.
- ☐ Parodonte réduit (patient ayant une parodontite stable).
- ☐ Parodonte réduit (patient n'étant pas atteint de parodontite).
- ☐ Gingivite induite par le biofilm dentaire seul.
- ☐ Gingivite associée aux facteurs de risque systémiques ou locaux.
- ☐ Augmentation du volume gingival due à la médication.
- ☐ Parodontite.
- ☐ Parodontite secondaire à une maladie systémique.
- ☐ Gingivite nécrosante.
- ☐ Parodontite nécrosante.
- ☐ Stomatite nécrosante.
- ☐ Abscès parodontal.
- ☐ Lésion endo-paro.

Question: 8 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Quels sont les diagnostics pour ce patient?

- ☐ Santé gingivale clinique.
- ☐ Gingivite.
- ☐ Parodontite.
- ☐ Parodonte intact.
- ☐ Parodonte réduit.
- ☐ Patiente n'étant pas atteinte de parodontite.
- ☐ Patiente ayant une parodontite stable.
- ☐ Stade I.
- ☐ Stade II.
- ☐ Stade III.
- ☐ Stade IV.
- ☐ Grade A.
- ☐ Grade B.
- ☐ Grade C.
- ☐ Localisée.
- ☐ Généralisée.
- ☐ Distribution molaire/incisive.

Question: 9 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels des éléments suivants doivent être inclus dans la prise en charge parodontale de ce patient?

- ☐ Débridement non chirurgical.
- ☐ Thérapie antimicrobienne localisée.
- ☐ Thérapie antimicrobienne systémique.
- ☐ Gingivectomie.
- ☐ Débridement avec lambeau ouvert positionné apicalement.
- ☐ Débridement avec lambeau ouvert non positionné apicalement.
- ☐ Chirurgie avec résection osseuse.
- ☐ Wedge distal.
- ☐ Régénération tissulaire guidée.
- ☐ Greffe osseuse/greffe de comblement.
- ☐ Curetage gingival.
- ☐ Lambeau positionné coronairement.
- ☐ Lambeau positionné latéralement.
- ☐ Greffe gingivale autogène libre.
- ☐ Greffe de tissu conjonctif sous-épithélial.
- ☐ Extraction.
- ☐ Aucun des choix ci-dessus.

Question: 10 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels parmi les diagnostics suivants sont appropriés pour la dent ____?

- ☐ Pulpe normale.
- ☐ Pulpite réversible.
- ☐ Pulpite irréversible symptomatique.
- ☐ Pulpite irréversible asymptomatique.
- ☐ Pulpe nécrotique.
- ☐ Tissus apicaux normaux.
- ☐ Pérodontie apicale symptomatique.
- ☐ Pérodontie apicale asymptomatique.
- ☐ Abscès apical aigu.
- ☐ Abscès apical chronique.

Question: 11 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels parmi les choix suivants seraient les plus appropriés pour obtenir l'anesthésie lors de l'extraction de la dent ____?

- ☐ Infiltration/Injection suprapériostique/parapériostique.
- ☐ Anesthésie tronculaire (standard) au maxillaire inférieur.
- ☐ Anesthésie tronculaire du nerf incisif.
- ☐ Anesthésie tronculaire du nerf mentonnier.
- ☐ Anesthésie tronculaire de type Gow-Gates au niveau du nerf mandibulaire.
- ☐ Anesthésie tronculaire du nerf buccal.
- ☐ Injection au niveau du ligament parodontal (intraligamentaire).
- ☐ Injection intraosseuse.
- ☐ Injection intrapulpaire.
- ☐ Technique de Varizani/Akinosi.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Question: 12 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Les signes et symptômes de ce patient sont surtout compatibles avec laquelle des conditions suivantes?

- ☐ Crise d'asthme aiguë.
- ☐ Obstruction des voies respiratoires supérieures.
- ☐ Réaction allergique de faible intensité.
- ☐ Anaphylaxie.
- ☐ Angine de poitrine/infarctus du myocarde.
- ☐ Arrêt cardiaque.
- ☐ Accident vasculaire cérébral.
- ☐ Hyperglycémie.
- ☐ Hypoglycémie.
- ☐ Hyperventilation.
- ☐ Réaction toxique à l'agent anesthésique local.
- ☐ Réaction à l'épinéphrine.
- ☐ Syncope.
- ☐ Crise convulsive.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Question: 13 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels des éléments suivants doivent être inclus dans la prise en charge immédiate de la patiente?

- ☐ Aucune intervention n'est nécessaire.
- ☐ Administrer de l'acide acétylsalicylique.
- ☐ Administrer de la diphenhydramine.
- ☐ Administrer de l'épinéphrine.
- ☐ Administrer du glucagon et/ou du glucose par voie orale.
- ☐ Administrer de la nitroglycérine.
- ☐ Administrer de l'oxygène.
- ☐ Administrer du salbutamol.
- ☐ Respirer dans le creux des mains.
- ☐ Basculer la tête/relever le menton.
- ☐ Ventiler le patient et débiter les compressions cardiaques.
- ☐ Poussées sur l'abdomen.
- ☐ Nettoyage de la bouche avec le doigt (finger sweep).
- ☐ Utilisation d'un défibrillateur externe automatique.
- ☐ Appeler les services médicaux d'urgence.

Information additionnelle: Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.

DR. Y. XXXXXXXX, D.M.D.
100 RUE N'IMPORTE QUELLE
VILLE N'IMPORTE OÙ, CANADA

Date: 10 novembre, 2024

Nom: Pierre Untel
Address: 123 rue Main
Ottawa, Ontario

R_x

Amoxicilline 500 mg
Disp: 15 (quinze)
Sig: Prendre 1 capsule tid, prendre au complet

☒ NE PAS RÉPÉTER

☐ RÉPÉTER ____ FOIS

SIGNATURE: Y. XXXXXXXX
Dr. Y. XXXXXXXX, D.M.D.

En utilisant l'information fournie, répondre à la question.

Question: 14 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels des choix suivants s'appliquent à cette ordonnance?

- ☐ Ordonnance acceptable.
- ☐ Nom du médicament mal orthographié.
- ☐ Médicament contreindiqué.
- ☐ Médicament mettant la vie du patient en danger.
- ☐ Médicament n'est pas la première option pour cette situation.
- ☐ Teneur inexacte du médicament.
- ☐ Quantité inexacte du médicament par administration.
- ☐ Posologie quotidienne excessive.
- ☐ Durée excessive.
- ☐ Durée insuffisante.
- ☐ Fréquence inexacte.
- ☐ La sélection répéter/ne pas répéter est incorrecte.

En utilisant l'information fournie, répondre à la question.

Question: 15 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquelles des caractéristiques faciales possède ce patient?

- ☐ Profil convexe.
- ☐ Profil droit.
- ☐ Profil concave.
- ☐ Rétrognathisme.
- ☐ Orthognathisme.
- ☐ Prognathisme.
- ☐ Hauteur de la région inférieure du visage allongée.
- ☐ Hauteur de la région inférieure du visage normale.
- ☐ Hauteur de la région inférieure du visage réduite.
- ☐ Angle nasolabial aigu.
- ☐ Angle nasolabial obtus.
- ☐ Lèvre supérieure courte.
- ☐ Scellement labial inadéquat.
- ☐ Lèvres proéminentes.

Question: 16 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quelle classe d'occlusion présente ce patient?

- ☐ Classe I d'Angle.
- ☐ Classe II d'Angle division 1.
- ☐ Classe II d'Angle division 2.
- ☐ Classe II d'Angle division 1 subdivision droite.
- ☐ Classe II d'Angle division 1 subdivision gauche.
- ☐ Classe II d'Angle division 2 subdivision droite.
- ☐ Classe II d'Angle division 2 subdivision gauche.
- ☐ Classe III d'Angle.
- ☐ Classe III d'Angle subdivision droite.
- ☐ Classe III d'Angle subdivision gauche.

Question: 17 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.) Le patient présente

- ☐ un maxillaire supérieur sans manque d'espace.
- ☐ un maxillaire inférieur sans manque d'espace.
- ☐ un encombrement au maxillaire supérieur.
- ☐ un encombrement au maxillaire inférieur.
- ☐ des espaces au maxillaire supérieur.
- ☐ des espaces au maxillaire inférieur.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Les mesures céphalométriques du/de la patient(e) sont:

SNA =	(moyenne = 81 degrés)
SNB =	(moyenne = 79 degrés)
Angle du plan mandibulaire =	(moyenne = 32 degrés)
Angle des incisives centrales supérieures au plan palatin =	(moyenne = 112 degrés)
Angle des incisives centrales inférieures au plan mandibulaire =	(moyenne = 90 degrés)


Question: 18 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Les mesures céphalométriques fournies nous indiquent que, le patient présente

- ☐ un prognathisme du maxillaire supérieur.
- ☐ un maxillaire supérieur positionné normalement.
- ☐ un rétrognathisme du maxillaire supérieur.
- ☐ un prognathisme du maxillaire inférieur.
- ☐ un maxillaire inférieur positionné normalement.
- ☐ un rétrognathisme du maxillaire inférieur.
- ☐ un plan mandibulaire plat (fermé).
- ☐ un plan mandibulaire normal.
- ☐ un plan mandibulaire incliné (ouvert).
- ☐ des incisives supérieures inclinées labialement.
- ☐ des incisives supérieures inclinées normalement.
- ☐ des incisives supérieures inclinées lingualemment.
- ☐ des incisives inférieures inclinées labialement.
- ☐ des incisives inférieures inclinées normalement.
- ☐ des incisives inférieures inclinées lingualemment.

Évaluation du Jugement Clinique^{MD}

Exemples de questions sur l'interprétation radiologique



Question: 1 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Il y a présence de carie sur lesquelles des surfaces suivantes?

- ☐ Distal de la dent __.
- ☐ Mésial de la dent __.
- ☐ Distal de la dent __.
- ☐ Mésial de la dent __.
- ☐ Distal de la dent __.
- ☐ Mésial de la dent __.
- ☐ Distal de la dent __.
- ☐ Mésial de la dent __.
- ☐ Aucun des choix ci-dessus.

Question: 2 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels des éléments suivants sont présents sur l'image au niveau de la dent ____?

- ☐ Perte osseuse au mésial.
- ☐ Perte osseuse au distal.
- ☐ Surplus gingival de la restauration au mésial.
- ☐ Surplus gingival de la restauration au distal.
- ☐ Tartre au mésial.
- ☐ Tartre au distal.
- ☐ Carie au mésial.
- ☐ Carie au distal.
- ☐ Aucun des choix ci-dessus.

Question: 3 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels parmi les choix suivants sont présents sur l'image?

- ☐ Carie.
- ☐ Tartre.
- ☐ Restauration défectueuse.
- ☐ Corps étranger.
- ☐ Perte osseuse parodontale.
- ☐ Résorption radiculaire.
- ☐ Rétention de dent primaire.
- ☐ Fragment radiculaire.
- ☐ Ostéite raréfiante.
- ☐ Ostéite sclérosante.
- ☐ Attrition/abrasion.
- ☐ Hypercémentose.
- ☐ Fracture radiculaire.
- ☐ Aucun des choix ci-dessus.

Question: 4 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Au niveau de la dent ____, quels éléments peuvent être identifiés sur l'image?

- ☐ Carie occlusale.
- ☐ Carie mésiale.
- ☐ Carie distale.
- ☐ Carie radiculaire.
- ☐ Collet surexposé.
- ☐ Résorption radiculaire physiologique.
- ☐ Résorption interne de la racine.
- ☐ Résorption externe de la racine.
- ☐ Dent fracturée.
- ☐ Ostéite raréfiante.
- ☐ Ostéite sclérosante.
- ☐ Pulpe oblitérée.
- ☐ Tartre.
- ☐ Attrition.
- ☐ Restauration défectueuse.

Question: 5 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels parmi les choix suivants sont présents sur l'image?

- ☐ Ostéosclérose.
- ☐ Dysplasie osseuse périapicale.
- ☐ Racine(s) résiduelle(s).
- ☐ Pseudokyste antral.
- ☐ Ostéite sclérosante.
- ☐ Dent(s) surnuméraire(s).
- ☐ Corps étranger.
- ☐ Ostéome.
- ☐ Kyste osseux traumatique.
- ☐ Tumeur maligne.

Question: 6 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Lesquels parmi les choix suivants sont présents sur l'image?

- ☐ Os hyoïde.
- ☐ Septum antral.
- ☐ Colonne cervicale.
- ☐ Ganglions lymphatiques calcifiés.
- ☐ Ligament stylohyoïdien calcifié.
- ☐ Sialolithe.
- ☐ Odontome.
- ☐ Arcade zygomatique.
- ☐ Crête oblique externe.
- ☐ Torus.
- ☐ Tumeur maligne.

Question: 7 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Lesquels des éléments suivants décrivent le traitement endodontique de la dent ____?

- ☐ Perforation apicale.
- ☐ Perforation latérale.
- ☐ Déviation apicale.
- ☐ Instrument fracturé.
- ☐ Formation d'une marche.
- ☐ Densité inadéquate de l'obturation canalaire.
- ☐ Surinstrumentation.
- ☐ Sousinstrumentation.
- ☐ Obturation en excès/extrusion.
- ☐ Obturation canalaire trop courte.
- ☐ Canal non traité.
- ☐ Matériau d'obturation inadéquat.
- ☐ Acceptable.
- ☐ Non réussi.

Question: 8 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels parmi les choix suivants peuvent compliquer le traitement endodontique de la dent ____?

- ☐ Aucun facteur de complication n'est présent.
- ☐ Présence de canaux accessoires/subdivision canalaire.
- ☐ Racine courbée/morphologie radiculaire atypique.
- ☐ Pulpolithes/calcification de la chambre pulpaire.
- ☐ Canal(aux) calcifié(s).
- ☐ Résorption interne.
- ☐ Résorption externe.
- ☐ Restauration extensive.
- ☐ Carie.
- ☐ Dent en rotation ou basculée.
- ☐ Fracture dentaire.
- ☐ Apex ouvert.

Question: 9 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lesquels des choix suivants peuvent compliquer l'extraction de la dent ____?

- ☐ Hypercémentose.
- ☐ Morphologie radiculaire.
- ☐ Ankylose.
- ☐ Carie extensive.
- ☐ Proximité d'une/de dent(s) adjacente(s).
- ☐ Augmentation de la densité osseuse.
- ☐ Dent incluse.
- ☐ Dent isolée.
- ☐ Restauration extensive.
- ☐ Dent avec traitement de canal.
- ☐ Maxillaire inférieur/supérieur atrophié(s).
- ☐ Proximité du canal mandibulaire.
- ☐ Proximité du sinus maxillaire.
- ☐ Lésion pathologique associée.