

Évaluation du Jugement Clinique

Exemples de questions en Diagnostic, Plan de traitement et Prise de décisions cliniques

En utilisant l'information fournie, répondre aux questions ___ à ___ sur la feuille réponse.

Patient(e): Pierre Untel
123 rue Main
Ottawa, Ontario

Données sur le/la patient(e):

Âge:	Pression sanguine: /mmHg
Sexe:	Fréquence du pouls: bpm
Taille:cm	Fréquence respiratoire: /min
Poids:kg	Température: °C

Plainte principale:

Histoire de la plainte principale:

Histoire dentaire:

Histoire médicale:

Renseignements significatifs:
Médication courante:
Allergies:

Histoire sociale/familiale:

Renseignements significatifs:

Examen clinique:

Observations importantes:
Extraorales:
Intraorales:

Question: 1 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)


Lequel/Lesquels parmi les choix suivants devrait(ent) être inclus dans le plan de traitement de cette patiente?

- A. Antibiothérapie prophylactique.
- B. Confirmer que le niveau d'HbA1c est inférieur à 7%.
- C. Obtenir un INR récent avant une chirurgie.
- D. Administration d'une médication anxiolytique/sédative.
- E. Nitroglycérine en prophylaxie.
- F. Éviter les AINS.
- G. Éviter les opioïdes.
- H. Éviter l'épinéphrine.
- I. Minimiser l'utilisation d'épinéphrine.
- J. Éviter les anesthésiques locaux.
- K. Arrêter la médication courante avant le rendez-vous.
- L. Retarder les traitements de routine.
- M. Traiter à la fin de la journée.
- N. Doit être traitée(e) en milieu hospitalier.
- O. Aucun des choix ci-dessus.

Question: 2 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

En plus du sondage parodontal et de la palpation, lequel/lesquels parmi les tests et examens suivants est/sont indiqué(s) pour établir le diagnostic chez ce/cette patient(e)?

- A. Radiographie(s) rétroalvéolaire(s).
- B. Radiographie(s) rétrocoronaire(s).
- C. Radiographie panoramique.
- D. Percussion de la dent.
- E. Application de pression sur chaque cuspide.
- F. Évaluation de la mobilité dentaire.
- G. Test pulpaire électrique.
- H. Test(s) thermique(s).
- I. Évaluation de l'occlusion.
- J. Anesthésie locale sélective.
- K. Test sanguin.
- L. Test microbiologique.
- M. Frottis cytologique.
- N. Biopsie d'incision.
- O. Biopsie-exérèse.



Question: 3 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité que l'on voit sur la photographie ci-dessus?

- A. Linea alba.
- B. Granules de Fordyce.
- C. Leucoedème.
- D. Leucoplasie/hyperkératose avec ou sans dysplasie.
- E. Leucokératose traumatique /kératose de frottement.
- F. Brûlure à la muqueuse.
- G. Lichen plan.
- H. Candidose.
- I. Leucoplasie chevelue.
- J. Lupus érythémateux.
- K. Naevus blanc spongieux.
- L. Langue géographique/glossite exfoliative marginée.
- M. Plaques muqueuses de la syphilis secondaire.
- N. Langue chevelue.
- O. Carcinome verruqueux.

Question: 4 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité que l'on voit sur la photographie ci-dessus?

- A. Ulcère(s) aphteux.
- B. Herpès zoster.
- C. Ulcère(s) traumatique(s).
- D. Herpès simplex récurrent.
- E. Gingivostomatite herpétique primaire.
- F. Gingivite ulcéralive nécrosante.
- G. Langue géographique/glossite exfoliative marginée.
- H. Herpangine.
- I. Tatouage d'amalgame.
- J. Érythroplasie.
- K. Carcinome spinocellulaire.
- L. Pemphigoïde cicatricielle/pemphigoïde des membranes muqueuses.
- M. Pemphigus vulgaire.
- N. Érythème polymorphe.
- O. Mélanose du fumeur.

Question: 5 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Quel est le diagnostic le plus probable de l'entité que l'on voit sur la photographie ci-dessus?

- A. Orifice du canal de Sténon.
- B. Torus.
- C. Granulome pyogène.
- D. Mucocèle.
- E. Hémangiome.
- F. Polype fibroépithélial/fibrome d'origine traumatique.
- G. Neurome traumatique.
- H. Papillome/verruca vulgaris.
- I. Adénome salivaire.
- J. Tumeur à cellules granuleuses.
- K. Kyste gingival.
- L. Abscess.
- M. Hyperplasie papillaire inflammatoire (stomatite prothétique).
- N. Epulis fissuratum (hyperplasie d'irritation prothétique).
- O. Carcinome spinocellulaire.

Question: 6 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lequel/Lesquels parmi les choix suivants est/sont indiqué(s) lors de la prise en charge de l'entité montrée sur la photographie ci-dessus?

- A. Pas de traitement.
- B. Antimicrobien topique.
- C. Antimicrobien systémique.
- D. Corticostéroïde topique.
- E. Corticostéroïde systémique.
- F. Anesthésique topique.
- G. Analgésique systémique.
- H. Pansement protecteur.
- I. Éliminer le/les facteur(s) étiologique(s).
- J. Débridement.
- K. Biopsie d'incision.
- L. Biopsie-exérèse.
- M. Évaluation médicale.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Buccal

Dent						
Profondeur au sondage						
Récession						
Saignement au sondage						

Lingual

Dent						
Profondeur au sondage						
Récession						
Saignement au sondage						

Mobilité						
Furcation						

Question: 7 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Laquelle/Lesquelles parmi les conditions suivantes reflète(nt) l'état parodontal de ce/cette patient(e)?

- A. État parodontal normal.
- B. Hypertrophie gingivale due à la médication.
- C. Parodontite agressive généralisée.
- D. Parodontite chronique généralisée.
- E. Parodontite agressive localisée.
- F. Parodontite chronique localisée.
- G. Abscès parodontal.
- H. Gingivite modifiée par des facteurs systémiques.
- I. Gingivite associée à la présence de plaque seulement.
- J. Gingivite ulcéralive nécrosante.
- K. Parodontite ulcéralive nécrosante.
- L. Manifestations gingivales d'une maladie systémique.
- M. Lésion endo-paro.
- N. Fracture radulaire.

Question: 8 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Laquelle/Lesquelles parmi les interventions suivantes est/sont appropriée(s) pour la prise en charge de cette condition parodontale?

- A. Débridement non chirurgical.
- B. Antibiothérapie systémique.
- C. Extraction.
- D. Débridement avec lambeau ouvert positionné apicalement.
- E. Débridement avec lambeau ouvert non positionné apicalement.
- F. Lambeau positionné coronairement.
- G. Lambeau positionné latéralement.
- H. Greffe de gencive libre (autogène).
- I. Greffe de tissu conjonctif sous-épithélial.
- J. Régénération tissulaire guidée.
- K. Greffe osseuse.
- L. Gingivectomie/gingivoplastie.
- M. Distal wedge.
- N. Curetage gingival.

Question: 9 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Lequel/Lesquels parmi les diagnostics suivants est/sont approprié(s) pour la dent _____?

- A. Pulpe normale.
- B. Pulpite réversible.
- C. Pulpite irréversible symptomatique.
- D. Pulpite irréversible asymptomatique.
- E. Pulpe nécrotique.
- F. Tissus apicaux normaux.
- G. Pérodontie apicale symptomatique.
- H. Pérodontie apicale asymptomatique.
- I. Abscès apical aigu.
- J. Abscès apical chronique.

Question: 10 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Parmi les choix suivants, lequel/lesquels serait (ent)/aurait(ent été approprié(s) pour obtenir l'anesthésie _____?

- A. Infiltration/Injection suprapériostique/parapériostique.
- B. Anesthésie tronculaire (standard) au maxillaire inférieur.
- C. Anesthésie tronculaire du nerf incisif.
- D. Anesthésie tronculaire du nerf mentonnier.
- E. Anesthésie tronculaire de type Gow-Gates au niveau du nerf mandibulaire.
- F. Anesthésie tronculaire du nerf buccal.
- G. Injection au niveau du ligament parodontal (intra-ligamentaire).
- H. Injection intraosseuse.
- I. Injection intrapulpaire.
- J. Technique de Varizani/Akinosi.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Question: 11 (Choisir **UNE** bonne réponse.)

Les signes et symptômes de ce/cette patient(e) sont surtout compatibles avec laquelle des conditions suivantes?

- A. Crise d'asthme aiguë (bronchospasme).
- B. Obstruction des voies respiratoires supérieures.
- C. Réaction allergique de faible intensité.
- D. Anaphylaxie.
- E. Angine de poitrine/infarctus du myocarde.
- F. Arrêt cardiaque.
- G. Accident vasculaire cérébral.
- H. Hyperglycémie.
- I. Hypoglycémie.
- J. Hyperventilation.
- K. Réaction toxique à l'agent anesthésique local.
- L. Réaction à l'épinéphrine.
- M. Syncope vasovagale.
- N. Crise convulsive.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Question: 12 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Parmi les choix suivants, lequel/lesquels est/sont approprié(s) pour la prise en charge immédiate de ce/cette patient(e)?

- A. Aucune intervention n'est nécessaire.
- B. Administrer de l'acide acétylsalicylique.
- C. Administrer de la diphenhydramine.
- D. Administrer de l'épinéphrine.
- E. Administrer du glucagon et/ou du glucose par voie orale.
- F. Administrer de la nitroglycérine.
- G. Administrer de l'oxygène.
- H. Administrer du salbutamol.
- I. Respirer dans le creux des mains.
- J. Basculer la tête/relever le menton.
- K. Ventiler le patient et débiter les compressions cardiaques.
- L. Poussées sur l'abdomen.
- M. Nettoyage de la bouche avec le doigt (finger sweep).
- N. Utilisation d'un défibrillateur externe automatique.
- O. Appeler les services médicaux d'urgence.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

DR Y. XXXXXXX, D.D.S. 100 RUE N'IMPORTE QUELLE VILLE N'IMPORTE OÙ, CANADA	
Date: <u>3 juin, 2018</u>	
Nom:	<u>Marie Jones</u>
Address	<u>123 rue Main</u> <u>Ottawa, Ontario</u>
<hr/>	
Rx	
Amoxicilline 500 mg	
Disp: 15 capsules	
Sig: Prendre 1 capsule tid, prendre au complet	
<input checked="" type="checkbox"/>	NE PAS RÉPÉTER
<input type="checkbox"/>	RÉPÉTER ____ FOIS.
SIGNATURE: <u>Y. XXXXXXX</u> Dr Y. XXXXXXX, D.M.D.	

En utilisant l'information fournie, répondre à la question.

Question: 13 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Lequel/Lesquels parmi les choix suivants s'applique(nt) à cette ordonnance?

- A. Ordonnance acceptable.
- B. Structure de l'ordonnance inacceptable.
- C. Nom du médicament mal orthographié.
- D. Médicament contreindiqué.
- E. Médicament mettant la vie du patient en danger.
- F. Médicament n'est pas la première option pour cette situation.
- G. Teneur inexacte du médicament.
- H. Quantité inexacte du médicament par administration.
- I. Posologie quotidienne excessive.
- J. Durée excessive.
- K. Durée insuffisante.
- L. Fréquence inexacte.
- M. La sélection répéter/ne pas répéter est incorrecte.
- N. Directives inexactes/ambiguës.

Question: 14 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Laquelle/Lesquelles des caractéristiques faciales possède ce/cette patient(e)?

- A. Profil convexe.
- B. Profil droit.
- C. Profil concave.
- D. Rétrognathisme.
- E. Orthognathisme.
- F. Prognathisme.
- G. Hauteur de la région inférieure du visage: allongée.
- H. Hauteur de la région inférieure du visage: normale.
- I. Hauteur de la région inférieure du visage: réduite.
- J. Angle nasolabial aigu.
- K. Angle nasolabial obtus.
- L. Lèvre supérieure courte.
- M. Scellement labial inadéquat.
- N. Lèvres proéminentes.

Question: 15 (Choisir **UNE** bonne réponse.)
Quelle classe d'occlusion présente ce/cette patient(e)?

- A. Classe I d'Angle.
- B. Classe II d'Angle division 1.
- C. Classe II d'Angle division 2.
- D. Classe II d'Angle division 1 subdivision droite.
- E. Classe II d'Angle division 1 subdivision gauche.
- F. Classe II d'Angle division 2 subdivision droite.
- G. Classe II d'Angle division 2 subdivision gauche.
- H. Classe III d'Angle.
- I. Classe III d'Angle subdivision droite.
- J. Classe III d'Angle subdivision gauche.

Question: 16 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Le patient présente

- A. un maxillaire supérieur sans manque d'espace.
- B. un maxillaire inférieur sans manque d'espace.
- C. un encombrement au maxillaire supérieur.
- D. un encombrement au maxillaire inférieur.
- E. des espaces au maxillaire supérieur.
- F. des espaces au maxillaire inférieur.

Information additionnelle: *Tel que résumé de cas, information concernant l'examen ou tableau parodontal.*

Les mesures céphalométriques du/de la patient(e) sont:

SNA =	(moyenne = 81 degrés)
SNB =	(moyenne = 79 degrés)
Angle du plan mandibulaire =	(moyenne = 32 degrés)
Angle des incisive centrales supérieures au plan palatin =	(moyenne = 112 degrés)
Angle des incisive centrales inférieurs au plan mandibulaire =	(moyenne = 90 degrés)

Question: 17 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)


Les mesures céphalométriques fournies nous indiquent que, le/la patient(e) présente

- A. un prognathisme du maxillaire supérieur.
- B. un maxillaire supérieur positionné normalement.
- C. un rétrognathisme du maxillaire supérieur.
- D. un prognathisme du maxillaire inférieur.
- E. un maxillaire inférieur positionné normalement.
- F. un rétrognathisme du maxillaire inférieur.
- G. un plan mandibulaire plat (fermé).
- H. un plan mandibulaire normal.
- I. un plan mandibulaire incliné (ouvert).
- J. des incisives supérieures inclinées labialement.
- K. des incisives supérieures inclinées normalement.
- L. des incisives supérieures inclinées lingualement.
- M. des incisives inférieures inclinées labialement.
- N. des incisives inférieures inclinées normalement.
- O. des incisives inférieures inclinées lingualement.

Évaluation du Jugement Clinique

Exemples de questions en Interprétation radiologique

En utilisant l'image, répondre à la question suivante sur la feuille réponse.



Question: 1 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Il y a évidence radiologique de carie au

- A. distal de la dent ____.
- B. mésial de la dent ____.
- C. distal de la dent ____.
- D. mésial de la dent ____.
- E. distal de la dent ____.
- F. mésial de la dent ____.
- G. distal de la dent ____.
- H. mésial de la dent ____.
- I. Aucun des choix ci-dessus.

Question: 2 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Au niveau de la dent ____, quel(s) élément(s) de la liste suivante peut/peuvent être identifié(s) sur l'image?

- A. Perte osseuse au mésial.
- B. Perte osseuse au distal.
- C. Surplus gingival de la restauration au mésial.
- D. Surplus gingival de la restauration au distal.
- E. Tartre sur la surface mésiale de la racine.
- F. Tartre sur la surface distale de la racine.
- G. Carie au mésial.
- H. Carie au distal.
- I. Aucun des choix ci-dessus.

Question: 3 (Select **ONE OR MORE** correct answers.)

Lequel/Lesquels des éléments suivants est/sont visible(s) sur l'image?

- A. Carie.
- B. Tartre.
- C. Restauration défectueuse.
- D. Corps étranger.
- E. Perte osseuse parodontale.
- F. Résorption radiculaire.
- G. Rétention de dent primaire.
- H. Fragment radiculaire.
- I. Ostéite raréfiante.
- J. Ostéite sclérosante.
- K. Attrition/abrasion.
- L. Hypercémentose.
- M. Fracture radiculaire.
- N. Aucun des choix ci-dessus.

Question: 4 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Sur l'image, laquelle/lesquelles de ces entités est/sont présente(s) au niveau de la dent ____?

- A. Carie occlusale.
- B. Carie mésiale.
- C. Carie distale.
- D. Carie radiculaire.
- E. Collet surexposé.
- F. Résorption radiculaire physiologique.
- G. Résorption interne de la racine.
- H. Résorption externe de la racine.
- I. Dent fracturée.
- J. Zone radioclaire à la furcation.
- K. Zone radioclaire périapicale.
- L. Pulpe oblitérée.
- M. Tartre.
- N. Attrition.
- O. Restauration défectueuse ou inadéquate.

Question: 5 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Laquelle/Lesquelles des entités suivantes est/sont visible(s) sur l'image?

- A. Ostéosclérose.
- B. Dysplasie osseuse périapicale.
- C. Racine(s) résiduelle(s).
- D. Pseudokyste antral.
- E. Ostéite sclérosante.
- F. Dent(s) surnuméraire(s).
- G. Corps étranger.
- H. Ostéome.
- I. Kyste osseux traumatique.
- J. Tumeur maligne.

Question: 6 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Laquelle/Lesquelles des entités suivantes est/sont visible(s) sur l'image?

- A. Os hyoïde.
- B. Septum antral.
- C. Colonne cervicale.
- D. Ganglions lymphatiques calcifiés.
- E. Ligament stylohyoïdien calcifié.
- F. Image "fantôme".
- G. Sialolithe.
- H. Odontome.
- I. Arcade zygomatique.
- J. Crête oblique externe.
- K. Torus.
- L. Tumeur maligne.

Question: 7 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Au niveau du traitement de canal en cours de la dent ____, quel(s) élément(s) de la liste suivante peut/peuvent être identifié(s) sur la radiographie?

- A. Perforation apicale.
- B. Perforation latérale/Perforation par stripping.
- C. Déviation apicale (zipping).
- D. Perforation à la furcation.
- E. Séparation d'un instrument (bris de lime).
- F. Formation d'une marche.
- G. Compaction inadéquate.
- H. Obturation en excès/extrusion.
- I. Sous obturation.
- J. Acceptable.

Question: 8 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)
Laquelle/Lesquelles parmi les conditions suivantes peut/peuvent compliquer le traitement endodontique de la dent ____?

- A. Aucun facteur de complication n'est présent.
- B. Présence de canaux accessoires/subdivision canalaire.
- C. Racine courbée/morphologie radiculaire atypique.
- D. Pulpolithes/calcification de la chambre pulpaire.
- E. Canal(aux) calcifié(s).
- F. Résorption interne.
- G. Résorption externe.
- H. Restauration extensive.
- I. Carie.
- J. Dent en rotation ou basculée.
- K. Fracture dentaire.
- L. Apex ouvert.

Question: 9 (Choisir **UNE OU PLUSIEURS** bonnes réponses.)

Laquelle/Lesquelles parmi les situations suivantes peut/peuvent entraîner une complication lors de l'extraction de la dent ____?

- A. Hypercémentose.
- B. Morphologie radulaire.
- C. Ankylose.
- D. Carie extensive.
- E. Proximité d'une/de dent(s) adjacente(s).
- F. Augmentation de la densité osseuse.
- G. Dent incluse.
- H. Dent isolée.
- I. Restauration extensive.
- J. Dent avec traitement de canal.
- K. Maxillaire inférieur/supérieur atrophié(s).
- L. Proximité du canal mandibulaire.
- M. Proximité du sinus maxillaire.
- N. Lésion pathologique associée.